



VERANGO®

NEMATICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC).

INGREDIENTE ACTIVO: Fluopyram

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

VERANGO® es una Suspensión Concentrada (SC) que contiene 500 gramos de Fluopyram por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: VERANGO® es un nuevo nematocida, con excelente eficacia y prolongado tiempo de protección sobre nemátodos como: nemátodo barrenador del banano (*Radophulus similis*), nemátodo nodulador (*Meloydogine*).

Verango® es un nematocida que tiene acción prolongada, esta característica le permite mantener al cultivo con niveles muy bajos de infestación de nemátodos y una muy buena sanidad radicular, importante para el cultivo.

MODO DE ACCIÓN: VERANGO® es un nematocida de acción translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN: VERANGO® interfiere en los procesos de respiración de los nemátodos, inhibiendo los receptores de succinato deshidrogenasa en la mitocondria de las células.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: VERANGO® Puede aplicarse 1 vez por campaña en drench para control del nematodo barrenador de la raíz. Aplicar máximo 500 g/ha de fluopyram al suelo en la misma área de cultivo dentro del año calendario.

Preparación de la mezcla: Agitar el envase antes de su uso. Coloque agua en el tanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de VERANGO® en una premezcla de agua y vierta esta solución al tanque. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener la agitación constante. Evitar preparar el caldo de aspersión con aguas semiduras o duras. Nunca dejar mezcla de aspersión por más de 4 horas antes de aplicar para así evitar el tapado de las boquillas.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: Es compatible con los fungicidas, nematocidas utilizados en el cultivo de banano.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: VERANGO®, aplicado bajo las buenas prácticas agrícolas recomendadas en el panfleto no presenta fitotoxicidad.

PRECAUCIONES: Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III. Ligeramente peligroso

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 189-F1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis	* 500 g.ai/ha (banano / nematodos) * 0,6 ml Verango/ Planta
Ventana de Aplicación	* No hay restricción de uso
Application timing (pest)	* La aplicación debe ser programado para que coincida con los niveles de umbral económico
Tipo de aplicación	* Drench
Volumen de agua	* Drench ~ 100 ml/plant (~ 150 – 200 L/ha)

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS l/ha	PC (Periodo de Carencia)
Banano <i>Musa acuminata</i> AAA	Nematodo barrenador <i>Radophulus similis</i>	0.9	1 día

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com