



# TRIVIA®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP).

**INGREDIENTE ACTIVO:** Propineb + Fluopicolide.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** TRIVIA® es un polvo mojable (WP) que contiene 667 g de Propineb + 60 g de Fluopicolide por kg de producto comercial.

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** TRIVIA® protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la lancha antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

**MODO DE ACCIÓN:** TRIVIA® es un fungicida preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Propineb es un inhibidor multisitio y Fluopicolide con acción en proteínas específicas, es esencial en las interacciones con la membrana celular.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda la aplicación de TRIVIA® con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. TRIVIA® debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones de Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Estados iniciales de cultivo: 1 funda de 400 g por tanque de 200 litros. Comienzo de lluvias: 2 fundas de 400 g por tanque de 200 litros.

- Para conseguir una buena mezcla se debe diluir la dosis recomendada en un poco de agua hasta conseguir una suspensión homogénea.

- Vertir esta premezcla en el tanque del equipo que va a utilizarse, con la cantidad de agua necesaria. No deje de agitar el contenido.

**COMPATIBILIDAD DE MEZCLA:** Antes de realizar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO:** TRIVIA® en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

**PRECAUCIONES:** Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** II. Moderadamente peligroso.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:** 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

**REGISTRO AGROCALIDAD:** 161-F1/NA

**RECOMENDACIONES DE USO:**

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	PC (Periodo de Carencia)
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Lancha <i>Phytophthora infestans</i>	1.5	14
UVA <i>Vitis vinífera L.</i>	MILDIU <i>Plasmopara viticola</i>	*1.5	30

\* Uva dosis equivalente a 0.25% con un gasto de agua de 600l/ha.

Papa volumen de agua mínimo de 400 l/ha

Bayer S.A.  
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6  
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200  
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772  
www.bayerandina.com